

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS - SANIDAD ADMITE EL RIESGO DE TROMBO VENOSO

El peligro «no puede descartarse» si el uso es «repetido y frecuente», subraya un informe. La Agencia del Medicamento recoge además casos de sangrado, náuseas, vómitos y mareos



Un estudio elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios «Informe de evaluación de medicamentos con levonorgestrel autorizados», repasa los estudios científicos que dieron pie a la llegada al mercado del principio activo a comienzos de los años 90 en todo el mundo, recuerda las reacciones adversas más frecuentes y **resalta dos «problemas de seguridad» del producto detectados precisamente tras su autorización.**

Son **el riesgo de «embarazo ectópico» o extrauterino** en algunas consumidoras, que ya aparece descrito en el prospecto, y alude también a **«un riesgo potencial de aparición de tromboembolismo venoso».**

Esta peligrosa enfermedad cardiovascular se desencadena por la **presencia de un coágulo de sangre en una vena profunda** y su peligro está condicionado por la posibilidad de que se desprenda y viaje a través del torrente sanguíneo, pudiendo bloquear incluso una vena de los pulmones.

De acuerdo con la decisión que adoptó el Gobierno al excluir la receta médica del fármaco como requisito imprescindible, **nada impide que una joven acuda durante el mismo día o días sucesivos a diferentes boticas** o a la misma para llevarse libremente el anticonceptivo de urgencia. No existen barreras administrativas ni sanitarias para impedir ese «uso excesivo» del que habla el Ministerio.